



Consorci de les Gavarres

Gavarres

PROGRAMA DE SEGUIMENT DE LES
POBLACIONS DE SENGLAR A CATALUNYA

TEMPORADA 2020-2021

Informe per a les colles participants



PROGRAMA DE SEGUIMENT DE LES POBLACIONS DE SENGLAR A CATALUNYA GAVARRES – TEMPORADA 2020-2021

Entitats promotores del Programa de seguiment de les poblacions de senglar a Catalunya:

- Consorci de les Gavarres
- Generalitat de Catalunya. Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC). Direcció General d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi
- Diputació de Barcelona – Oficina Tècnica de Parcs Naturals

Coordinació del seguiment a les Gavarres:

Oriol Armet i Enric Bisbe, gerent i tècnic del Consorci de les Gavarres.

Anotació de dades de les batudes als Carnets de colla senglanaire:

Colles dels Astronautes (Cassà de la Selva), Celrà, En Fita (el Cartutxo), el Rostei (Begur), els Companys (Llagostera), els Molins (Calonge), Flaçà-Foixà-La Pera, Fonteta, la Marqueta Sant Pol, Mont-ràs (el Faisà), Nova de Fitor, Palafrugell, Palol d'Onyar (Quart), Sant Llorenç (Llagostera), Sant Martí i Madremanya, Santa Cristina d'Aro, Senglaners de la Bisbal, Senglar de Torrent, Tall Gros i Vikingus (Cassà de la Selva). Les dades s'han facilitat a través de la Federació Catalana de Caça, representació territorial de Girona.

Autors de la memòria:

Carme Rosell, Joana Colomer, Ferran Navàs i Berta Pericas, amb la col·laboració d'Anna Colomer.

MINUARTIA

Setembre de 2021

ÍNDEX

1. EL PROGRAMA DE SEGUIMENT DE SENGLAR A CATALUNYA	1
2. COLLES PARTICIPANTS I ESFORÇ DE CAÇA A LES GAVARRES.....	3
3. NOMBRE DE CAPTURES I DENSITAT DE SENGLAR	5
4. CARACTERÍSTIQUES DELS SENGLARS CAÇATS.....	8
5. OBSERVACIONS DE CABIROLS I ALTRES UNGULATS A LES BATUDES.....	8
6. RESUM D'INDICADORS I RECOMANACIONS	10

1. EL PROGRAMA DE SEGUIMENT DE SENGLAR A CATALUNYA

El Programa de seguiment de les poblacions de senglar a Catalunya es va iniciar la temporada 1998-1999, fa **23 anys**, seguint el model implantat a la Zona Volcànica de la Garrotxa vuit anys abans. Actualment integra **22 observatoris** (Figura 1).

Les Gavarres s'incorporaren al Programa fa 16 anys, la temporada 2005-2006.

En cada observatori s'hi analitza l'evolució de les poblacions de senglar a partir de dades individualitzades de totes les batudes fetes durant el període hàbil de caça. El seguiment és possible gràcies a la col·laboració de colles de caçadors d'arreu del país, que faciliten les dades necessàries. En tots els espais s'aplica la mateixa metodologia. Així es disposa d'un registre comparable de l'evolució de les poblacions de senglar –i de la seva caça– i es poden definir les mesures de gestió més adequades a cada situació. La descripció de mètodes i els resultats globals del Programa es poden consultar a l'informe anual que es troba a la web del DACC i a la web de www.senqlar.cat.

L'augment de les poblacions de senglar a Catalunya, com arreu d'Europa, justifica la necessitat de disposar d'un seguiment acurat i a llarg termini en llocs representatius de diferents paisatges del país. Actualment, **l'objectiu de gestió de senglar es centra en aconseguir controlar la seva expansió i els danys que comporta** a l'agricultura, accidents en carreteres i presència en zones urbanes, entre altres. En el context de la prevenció de la Pesta Porcina Africana, la Comissió Europea també ha recomanat aplicar mesures per controlar les poblacions de senglar a Europa.

La cooperació de caçadors, tècnics i administracions en el marc del Programa de seguiment de senglar és clau per poder definir i aplicar les millors pràctiques de gestió d'aquesta espècie.

Espais del Programa de seguiment de senglar





Figura 1. Espais que integren la xarxa d'observatoris del Programa de seguiment de senglar.

La Figura 2 mostra l'evolució en les captures de senglar a Catalunya segons la memòria anual d'activitats cinegètiques del DACC. En aquesta memòria s'inclouen les captures realitzades durant el període hàbil en Àrees Privades de Caça, Reserves Nacionals de Caça i Zones de Caça Controlada, així com les captures efectuades a l'estiu i notificades mitjançant el formulari web de comunicacions de caceres per danys a l'agricultura.

La temporada 2020-2021 el nombre de senglars caçats a Catalunya s'ha mantingut similar a la temporada anterior.

Girona és la demarcació que històricament registra el major nombre de captures. La temporada 2019-2020 s'hi varen abatre el 34% dels senglars caçats a tot Catalunya.



La col·laboració de les colles senglanaires en l'anotació de les dades és essencial per portar a terme el seguiment. La seva constància en la participació dona una gran fiabilitat als resultats obtinguts.

2. COLLES PARTICIPANTS I ESFORÇ DE CAÇA A LES GAVARRES

A la temporada 2020-2021 **han participat en el seguiment 20 colles de caçadors** omplint els quaderns de batudes (Taula 1), tres colles més que la temporada anterior.

Taula 1. Colles participants a les Gavarres durant la temporada 2020-2021.




Astronautes (Cassà)	Fonteta	Sant Martí i Madremanya
Celrà	la Marqueta Sant Pol	Santa Cristina d'Aro
d'en Fita (el Cartutxo)	Mont-ràs (El Faisà)	Senglaners de la Bisbal
el Rostei (Begur)	Nova de Fitor	Senglar de Torrent
els Companys (Llagostera)	Palafrugell	Tall Gros
els Molins (Calonge)	Palol d'Onyar (Quart)	Vikingus (Cassà)
Flacà-Foixà-la Pera	Sant Llorenç (Llagostera)	

La Taula 2 mostra una síntesi de les dades referents a l'activitat cinegètica. L'evolució de les batudes per superfície i del nombre de caçadors participants en cada cacera a les Gavarres es mostren a les Figures 3 i 4. La Figura 5 mostra la distribució mensual de les batudes al llarg de la present temporada.

Amb l'objectiu d'estandarditzar el sistema de càlcul i que els indicadors de seguiment siguin comparables amb altres temporades i zones, s'analitzen només les batudes fetes durant el període hàbil.

Taula 2. Superfície cinegètica i esforç de caça a les Gavarres en la temporada 2020-2021.


Superfície de terrenys cinegètics	70.571 ha
Àrees cinegètiques	25 APC
Període hàbil de caça	6-set-2020 a 28-mar-2021 (ARP/1015/2020, de 12 de maig)
Total de batudes anotades	972
Batudes per superfície	1,3 batudes/km ²
Batudes per colla	49 batudes/colla
Mitjana de caçadors participants en cada batuda	18 (mín. 1 - màx. 88)
Mitjana de gossos utilitzats en cada batuda	16 (mín. 2 - màx. 150)



3. NOMBRE DE CAPTURES I DENSITAT DE SENGLAR

3.1 Senglars caçats en relació a la superfície de terrenys cinegètics i efectivitat de caça

Durant la temporada 2020-2021, a les Gavarres s'han caçat **2.111 senglars**. Una mitjana de 2,2 senglars caçats per batuda i **3,0 senglars caçats/km²** de terrenys cinegètics (Figura 6). S'han caçat el 38% dels senglars observats a les batudes, efectivitat de caça molt similar a la mitjana dels darrers 5 anys de seguiment que és del 39%.



3.2 Densitat de la població de senglar


L'estima de densitat és de **7,7 individus/km²** (Figura 7), similar a la dels anys anteriors. Es tracta d'una densitat elevada, però que no arriba als màxims enregistrats a altres espais del nord-est de Catalunya (Figura 8).

Segons l'indicador de densitat, que considera el nombre de captures en relació a les batudes realitzades i la superfície de terrenys cinegètics, **la densitat de senglar a les Gavarres s'ha mantingut estable respecte la temporada anterior** (Taula 4).


En general, les densitats de senglar han augmentat, excepte en poblacions del nord-est del país. Les diferències en la disponibilitat d'aliment i la pluviometria poden explicar les diferències observades. L'anyada d'aglà i altres fruits forestals durant la tardor de 2019 va ser bona en espais del Pirineu i Prepirineu, i la primavera i estiu de 2020 foren en general força plujosos, factors que afavoreixen l'augment de densitat. A les comarques del nord-est del país en canvi, la producció d'aglà fou més baixa i la primavera amb menor pluviometria de l'habitual, factors que poden haver influït en l'estabilització o descens de les densitats de senglar en aquests sectors.

Tot i el descens observat en algunes zones, les màximes densitats de senglar a Catalunya, entre 10 i 13 individus/km², es mantenen al quadrant nord-est del país, i concretament a Alt Empordà, la Garrotxa, les Guillerries, el Montseny, i sectors de serralades prelitorals, com el Montnegre i el Corredor; es tracta de zones amb elevada pluviometria i grans superfície de boscos productors de fruits forestals (alzines, roures, castanyers i faigs) i de conreus de regadiu, tots ells factors que afavoreixen una alta disponibilitat d'aliment. Amb densitats

Barcelona i la Catalunya central (Sant Llorenç del Munt, Serralades Litoral i Marina, Solsonès-Berguedà i Castell de Montesquiú). Entre 3 i 6 individus/km² s'hi troben Freser-Setcases, Garraf-Olèrdola-Foix, Alt Pallars, Alta Ribagorça, Boumort, la Noguera, ZCC de Collserola, i els observatoris de Tarragona (Montsant i Muntanyes de Prades). Les densitats més baixes, inferiors a 3 individus/km², es troben al Cadí, la Segarra i els Ports de Tortosa.



Estima de densitat de senglar a la xarxa d'observatoris del Programa de seguiment



3.3 Dades complementàries sobre mortalitat de senglar i altres ungulats

Tot i que l'anàlisi de dades del seguiment es centra en les batudes realitzades durant el període hàbil de caça, als quaderns de batudes les colles també anoten les que es porten a terme per reduir danys a l'agricultura durant l'estiu o amb autorització excepcional.

Enguany s'han anotat un total de 66 caceres realitzades fora del període de caça, en les quals s'han abatut 226 senglars. Si es sumen a les del període hàbil, s'obté un total de 1.038 batudes (el 6% fora del període hàbil), i de 2.337 senglars caçats (el 10% fora del període hàbil). El rendiment en batudes per danys és de 3,4 senglars caçats/batuda.

No s'han registrat captures de senglars amb altres mètodes diferents de la batuda. Tampoc s'han recopilat dades de senglars, o altres ungulats, morts per causes diferents de la caça.

Recordeu d'anotar a les fitxes del final dels quaderns totes les dades de senglars, cabirols o altres ungulats que es trobin morts, sigui atropellats, ofegats o per causa desconeguda.

Important

Degut a l'alerta per Pesta Porcina Africana a Europa (cap cas a Catalunya)

Si trobeu un senglar mort per causa desconeguda, no el toqueu i aviseu a


Agents Rurals – Tel 93 561 70 00

4. CARACTERÍSTIQUES DELS SENGLARS CAÇATS

4.1 Sexe i pes

Aquesta temporada s'ha caçat un nombre superior de femelles que de mascles i s'observen diferències estadísticament significatives respecte la proporció esperada de captures d'ambdós sexes, que és d'un mascle per cada femella (Figura 9).

En conjunt, el 49% dels senglars caçats pesaven menys de 50 kg i el 18% superaven els 70 kg (Figura 9). S'han caçat 22 senglars de pes igual o superior a 100kg, 20 dels quals eren mascles i 2 femelles. **El pes màxim dels senglars caçats enguany a les Gavarres ha estat el d'una femella de 130 kg.**



4.2 Observacions de porcs vietnamites i senglars encreuats


En alguns espais de la xarxa d'observatoris del Programa de seguiment de senglar s'enregistren porcs vietnamites i/o senglars encreuats amb porcs domèstics (vietnamites o d'altres races). A les Gavarres, enguany, s'ha anotat als carnets de batuda la observació de dos senglars encreuats amb porc domèstic i no s'ha anotat cap observació de porc vietnamita.

L'encreuament amb porcs no és gens desitjable, ja que contribueix a augmentar la productivitat de les poblacions de senglar i agreujar els problemes. Cal capturar els porcs i els individus encreuats el més aviat possible, per evitar la presència d'aquests animals al medi natural, i contribuir a la reducció de conflictes. **La Resolució de Vedes autoritza als caçadors a capturar porcs domèstics ensalvatgits i individus encreuats amb senglar** (amb clapes al pelatge o altres característiques que ho evidencien). És important anotar la seva captura o observació als quaderns de batudes.

Des de l'any 2019 el porc vietnamita està inclòs al 'Catàleg espanyol d'espècies exòtiques invasores' i per tant en queda prohibida la seva possessió, transport, tràfic o comerç d'exemplars vius, i s'estableixen una sèrie de controls per a la seva tinença. És important informar i sensibilitzar a les persones que tenen porc vietnamites com a mascota per tal que compleixin la normativa i evitar el seu alliberament a la natura, així com als responsables de granges o nuclis zoològics, per a que garanteixin un tancament efectiu que eviti que porcs i senglars puguin entrar en contacte.

5. OBSERVACIONS DE CABIROLS I ALTRES UNGULATS A LES BATUDES

Aquesta temporada s'ha observat cabirol (*Capreolus capreolus*) en 42 batudes (Taula 3 i Figura 10) i no s'han anotat captures als quaderns de batudes de senglars.



Taula 3. Altres ungulats detectats a les batudes de senglar a les Gavarres durant la temporada 2020-2021.

Espècie	Batudes amb observacions		Mitjana d'individus observats per batuda ²
	Nombre	Percentatge ¹	
Cabirol	42	4%	2,1

¹ Percentatge respecte el nombre total de batudes anotades als quaderns.

² Mitjana calculada tenint en compte només aquelles batudes on s'han realitzat observacions de l'espècie.

6. RESUM D'INDICADORS I RECOMANACIONS

Les Gavarres mostren una densitat de senglar elevada respecte altres observatoris inclosos al Programa de seguiment (Taula 4, amb indicadors de seguiment), i s'estabilitza respecte les temporades anteriors. La pressió de caça es mostra estable respecte la temporada anterior, tot i presentar fluctuacions al llarg del seguiment.

Taula 4. Resultats dels indicadors de seguiment obtinguts a les Gavarres, i el valor global dels observatoris del Programa de seguiment de senglar a Catalunya per a la temporada 2020-2021.

		Gavarres	Global observatoris PSS
Activitat cinegètica	1. Batudes realitzades per unitat de superfície (km ²)	1,3	0,9
	2. Caçadors participants a les batudes	18	21
	3. Gossos participants a les batudes	16	23
	4. Efectivitat de caça: proporció dels senglars caçats en relació al total d'observats	39%	38%
Senglars capturats	5. Senglars caçats per batuda	2,2	3,2
	6. Senglars caçats per unitat de superfície (km ²)	3	2,8
Densitat de població	7. Variació índex de densitat relativa respecte temporada anterior	0%	12%
	8. Estima de densitat de senglar (individus /km ²)	7,7	Mín.: 2,2 (Ports de Tortosa) Màx.: 12,9 (Montseny)
Sexe i pes dels senglars capturats	9. Proporció de sexes (M:F) de senglars caçats	0,85:1	0,95:1
	10. Distribució de pesos: % de femelles que superen els 30kg (efectiu reproductor)	77%	70%

Les recomanacions per a temporada 2020-2021 són les següents:

- **Cal seguir aplicant mesures per reduir -o estabilitzar- la densitat de senglar, mantenint la pressió de caça, augmentant l'efectivitat de les batudes i aplicant altres mesures on sigui necessari.** En general les poblacions poden tenir un alt potencial de creixement aquest any, ja que la producció de fruits forestals la tardor de 2020 va ser molt bona; tot i això, les sequeres pronunciades que moltes zones han patit durant la primavera de 2021 en limitaran l'augment. La col·laboració dels caçadors és un factor clau pel control d'aquesta espècie que no té predadors naturals (el llop té efectius massa escassos per controlar tants senglars).
- **La reducció de l'excés de densitat és necessària per controlar els notables problemes que genera el senglar,** especialment els derivats dels accidents a les carreteres i dels danys als conreus, que generen importants impactes econòmics i conflictivitat social.
- **L'alta densitat també comporta riscos sanitaris. Per prevenir la Pesta Porcina Africana la Comissió Europea ha recomanat aplicar estratègies per controlar les poblacions de senglar.** Actualment la PPA afecta 11 països europeus, i s'ha aconseguit erradicar en dos més: Bèlgica i la República Txeca. A Catalunya cal estar alerta per detectar si aparegués algun cas. **Si es troba algun senglar mort sense causa aparent, no el toqueu i truqueu el més ràpid possible a Agents Rurals.** Igualment, cal aplicar bones pràctiques en la manipulació de la carn de caça, ja que augmenten els casos de triquinel·losi, tuberculosi i altres malalties.
- **No doneu mengeu als senglars, sota cap circumstància.** Està prohibit i a més, la concentració de senglars als llocs on se'ls aporta aliment afavoreix la transmissió de malalties.
- **Per prevenir danys de senglar recordeu que està disponible la [Guia de Mesures per reduir els danys causats per mamífers de la fauna salvatge](#)** on hi ha informació sobre les mesures que es poden aplicar en diferents situacions.
- Per a més informació consulteu la *ARP/905/2021, de 29 de març*, per la qual es fixen les espècies objecte d'aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2021-2022 en tot el territori de Catalunya i recordeu:
 - El període hàbil per a la caça del porc senglar és el comprès entre el **5 de setembre de 2021 i el 27 de març de 2022** (ambdós inclosos).
 - **La caça del porc vietnamita ensalvatgit i els híbrids d'aquests amb senglar està autoritzada**, tant durant les batudes en període hàbil com en l'exercici de les autoritzacions excepcionals per danys. Des del 2019 aquesta espècie està inclosa al 'Catàleg espanyol d'espècies exòtiques invasores' i per tant en queda prohibida la seva possessió.

Totes les dades del Programa de Seguiment de Senglar a Catalunya, així com altra informació rellevant sobre l'espècie, la trobareu a la nova web: www.senglar.cat

Moltes gràcies un any més per la vostra col·laboració, i bona cacera.